

**ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ**  
**Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ**  
**22 ΜΑΪΟΥ 2007**

**ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ 1ο**

- A. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόμενα A και B ενός δειγματικού χώρου  $\Omega$  ισχύει  $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$ .

**Μονάδες 8**

B.

- a. Πότε μια συνάρτηση  $f$  λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη στο σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της;

**Μονάδες 4**

- b. Να δώσετε τον ορισμό της διαμέσου ( $\delta$ ) ενός δειγματος ν παρατηρήσεων, όταν ο ν είναι άρτιος αριθμός.

**Μονάδες 3**

- Γ1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε προτάση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- a. Στην περίπτωση των ποσοτικών μεταβλητών, οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες  $F_j$  εκφράζουν το ποσοστό των παρατηρήσεων που είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής  $x_j$ .

**Μονάδες 2**

- b. Αν  $f, g$  είναι δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις, τότε για την παράγωγο της σύνθετης συνάρτησης ισχύει:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

**Μονάδες 2**

- γ. Αν για μια συνάρτηση  $f$  ισχύουν  $f'(x_0) = 0$  για  $x_0 \in (a, b)$ ,  $f''(x) > 0$  στο  $(a, x_0)$  και  $f''(x) < 0$  στο  $(x_0, b)$ , τότε η  $f$  παρουσιάζει στο διάστημα  $(a, b)$  για  $x = x_0$  ελάχιστο.

**Μονάδες 2**

- Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις παραγώγους των παρακάτω συναρτήσεων:

$$\begin{array}{ll} f_1(x) = x^v, & \text{όπου } v \text{ φυσικός} \\ f_2(x) = \ln x, & \text{όπου } x > 0 \\ f_3(x) = \sqrt{x}, & \text{όπου } x > 0 \\ f_4(x) = \sin x, & \text{όπου } x \text{ πραγματικός} \end{array}$$

**Μονάδες 4**

**ΘΕΜΑ 2ο**

Δίνεται η συνάρτηση με τύπο  $f(x) = x e^x + 3$ , όπου  $x$  πραγματικός αριθμός.

α. Να αποδείξετε ότι  $f'(x) = f(x) + e^x - 3$

**Μονάδες 10**

β. Να βρεθεί το  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - e^x}{x^2 - x}$

**Μονάδες 15**

### ΘΕΜΑ 3ο

Έστω ο δειγματικός χώρος  $\Omega = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  για τον οποίο ισχύει:

$$P(-1) = P(0) = P(1) = P(2) = 2, P(3) = 2, P(4) = 2, P(5) = 2.$$

Ορίζουμε τα ενδεχόμενα του  $\Omega$ :

$$A = \{1, 3, x^2 - x - 3\}, \quad B = \{2, x + 1, 2x^2 + x - 2, -2x + 1\}$$

όπου  $x$  ένας πραγματικός αριθμός.

α. Να βρεθούν οι πιθανότητες των απλών ενδεχομένων του  $\Omega$ , δηλαδή οι:

$$P(-1), P(0), P(1), P(2), P(3), P(4), P(5).$$

**Μονάδες 7**

β. Να βρεθεί η μοναδική τιμή του  $x$  για την οποία ισχύει  $A \cap B = \{-1, 3\}$

**Μονάδες 8**

γ. Για  $x = -1$  να δειχθεί ότι:

$$P(A) = 5/11, \quad P(B) = 7/11, \quad P(A \cap B) = 3/11$$

και στη συνέχεια να υπολογιστούν οι πιθανότητες  $P(A - B)$  και  $P(A \cup B')$ .

**Μονάδες 10**

### ΘΕΜΑ 4ο

Θεωρούμε 2 δείγματα  $A$  και  $B$  με παρατηρήσεις:

Δείγμα  $A$ : 12, 18,  $t_3, t_4, \dots, t_{25}$

Δείγμα  $B$ : 16, 14,  $t_3, t_4, \dots, t_{25}$

Δίνεται ότι  $t_3 + t_4 + \dots + t_{25} = 345$ .

α. Να αποδείξετε ότι οι μέσες τιμές  $\bar{x}_A, \bar{x}_B$  και των δύο δειγμάτων  $A$  και  $B$  αντιστοιχούνται στην  $\bar{x}_A = \bar{x}_B = 15$ .

**Μονάδες 7**

β. Αν  $s_A^2$  είναι η διακύμανση του δείγματος  $A$  και  $s_B^2$  είναι η διακύμανση του δείγματος  $B$ , να αποδείξετε ότι  $s_A^2 - s_B^2 = 16/25$

**Μονάδες 8**

Αν ο συντελεστής μεταβολής του δείγματος  $A$  είναι ίσος με  $CV_A = 1/15$ , να βρείτε τον συντελεστή μεταβολής  $CV_B$  του δείγματος  $B$ .

**Μονάδες 10**